

NOTICIAS

Actualización sobre la 69.ª Asamblea Mundial de la Salud

Los delegados en la Asamblea Mundial de la Salud han acordado resoluciones y decisiones sobre la contaminación del aire, las sustancias químicas, el personal sanitario, la obesidad infantil, la violencia, las enfermedades no transmisibles y la elección del próximo Director General. Cada año se producen 4,3 millones de defunciones a causa de la exposición a la contaminación del aire en interiores y 3,7 millones de muertes debido a la contaminación del aire exterior. La nueva hoja de ruta, que se estructura en cuatro categorías, ofrece una descripción de las medidas que hay que adoptar entre 2016 y 2019.

En todo el mundo se producen 1,3 millones de muertes al año debido a la exposición a sustancias químicas como el plomo y los plaguicidas. Los delegados reiteraron su compromiso de garantizar que, para 2020, los productos químicos se utilicen y produzcan en formas que reduzcan al mínimo los efectos adversos de importancia para la salud humana y el medio ambiente.

Recent data on veterinary drug residues in animals and food

Un informe de la EFSA resume los datos de seguimiento a partir de 2014, incluyendo los niveles de cumplimiento de los límites de residuos de la UE, para una gama de medicamentos veterinarios, sustancias no autorizadas y contaminantes que se encuentran en animales y alimentos de origen animal.

En total, se registraron 730.000 muestras en 2014, procedentes de los 28 Estados miembros de la UE. En 2014, el nivel de incumplimiento en muestras elegidas como objetivo (es decir, las muestras tomadas para detectar el uso ilegal o para comprobar el incumplimiento de los niveles máximos) aumentó ligeramente, a 0,37%, en comparación con 0,25% -0,34% registrados durante los siete años anteriores.

Se registró un ligero incremento de los incumplimientos respecto a las resorcylic acid lactones (compuestos hormonalmente activos producidos por hongos o de origen antropogénico) y a contaminantes tales como metales y micotoxinas (toxinas producidas por hongos). Los datos sugieren altas tasas de cumplimiento general.

Systematic review on the period of incubation, infectiousness/shedding and exclusion for infectious diseases in children

ECDC llevó a cabo una revisión sistemática sobre el período de incubación y el período de contagiosidad/duración de la eliminación de 30 de las enfermedades infecciosas más comunes en los niños. También se examinó en el período de exclusión para los niños en las escuelas y otros centros de cuidado infantil. Los resultados

obtenidos pueden servir como herramienta para tomar medidas de salud pública, tales como la determinación del período mínimo de ausencia en la escuela para un niño/adolescente infectado. Entre las enfermedades revisadas se encuentran las siguientes enfermedades transmitidas por los alimentos: infecciones por enterovirus; gastroenteritis viral por el adenovirus, astrovirus, norovirus, calicivirus, sapovirus, rotavirus, hepatitis A; campylobacteriosis, infecciones por *Escherichia coli*, infecciones por *Salmonella* (no tifoidea, fiebre tifoidea y paratifoidea), shigelosis y giardiasis.

[Para consultar el informe completo.](#)

Salud alerta por la existencia de un agua mineral contaminada en Chipiona

Salud ha informado hoy de la existencia de una contaminación química en un lote de agua mineral embotellada de la marca «Fontarel» que ha sido distribuida, según la información de la empresa, en Chipiona (Cádiz) a través del distribuidor Bebidas Chipiona, S.L. a siete minoristas de alimentación y 22 establecimientos de hostelería. Según ha tenido constancia la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, dependiente de la Consejería de la Salud, por la comunicación realizada por la empresa Aguas del Pilar, S.L. de Loja (Granada), se ha detectado que una partida de agua mineral embotellada contiene ácido peracético, que puede provocar náuseas, vómitos, dificultad de deglución, quemaduras orales, esofágicas y del tracto gastrointestinal.

Los animales con patas rotas ya no son un problema para los tratantes de ganado

La asociación de operadores de ganado que preside Enrique Otero está satisfecha de haber ganado la primera batalla en su lucha contra la administración para que les reconociera una de las reivindicaciones que mantienen activas desde hace décadas. Esta organización pretendía que se pusiera en marcha un protocolo para que los animales que recogen en las granjas y que se rompen una pata en el transporte puedan ser sacrificados nada más llegar al matadero y en ausencia del veterinario de la industria. El tiempo es clave no sólo en el bienestar del animal, que no tiene porque prolongar su sufrimiento, a la espera de que se incorpore el profesional a su puesto en horario laboral, sino también a la hora de aprovechar su carne.

El pescado y marisco incautado en 2015 alcanza los casi 12.000 kilos, más del doble que el año anterior

Los servicios de Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía han intervenido un total de 11.966 kilos de pescado y marisco a lo largo del ejercicio 2015 en la provincia de Huelva por no alcanzar la talla reglamentaria, carecer de etiquetado o ser

transportado sin documentación, entre otras causas. En esta misma línea, este departamento de la Junta de Andalucía, en el marco del Programa de Control y Seguimiento de las Condiciones Sanitarias en las Zonas de Producción de moluscos bivalvos, gasterópodos y equinodermos del litoral andaluz, decreta el cierre preventivo de los caladeros cuando se detecta la presencia de biotoxinas con valores superiores a los establecidos legalmente. El objetivo, la protección de la salud pública y garantizar la calidad sanitaria de los productos pesqueros.

La Comisión Europea ha presentado los criterios para identificar los interferentes endocrinos en el campo de los productos fitosanitarios y biocidas

La Comisión Europea propone al Consejo y al Parlamento Europeo que adopten un enfoque sólido basado en datos científicos para la identificación de los disruptores endocrinos y que avallen la definición de la OMS.

Los interferentes endocrinos son sustancias, tanto naturales como de síntesis química, que pueden alterar las funciones del sistema hormonal y, en consecuencia, pueden causar efectos adversos en las personas o los animales.

En fecha 15 de julio de 2016, la Comisión Europea ha presentado dos proyectos de actos legislativos con criterios científicos que deben permitir una identificación más precisa de las sustancias químicas que son interferentes endocrinos en los ámbitos de los productos fitosanitarios y los biocidas.

¿Tu cocina pasa la ITV?

¿El pasar la ITV de su coche impedirá que un conductor pueda provocar un accidente de tráfico en el futuro? ¿El pasar un control de alcoholemia y no superar la tasa máxima garantiza que un conductor nunca ha conducido o conducirá en estado de embriaguez?

Obviamente la respuesta a estas preguntas es 'no'. Ahora, cuando se cumplen cuatro meses de la intoxicación alimentaria masiva (salmonelosis) en un establecimiento de Cádiz y del posterior cierre del mismo, el dueño ha podido reabrir su negocio en la Tacita de Plata, en el que lleva establecido "veinte años y pasando un montón de inspecciones", según comenta.

Statement by Commissioner Andriukaitis on the political agreement reached on the EU proposal for revision of the provisions on official controls along the food chain

"Doy la bienvenida al acuerdo político alcanzado ayer, miércoles 15 de junio, en el último diálogo a tres bandas entre los legisladores sobre la propuesta relativa a los controles oficiales. Esto nos acerca un paso más hacia normas más inteligentes para el cumplimiento de la legislación agroalimentaria. La UE se está equipando con un sistema de control más

simple y más eficaz en las áreas relacionadas con las normas de seguridad de alimentación, de los alimentos, requisitos veterinarios y fitosanitarios, la producción orgánica y normas de indicación geográfica protegida. Esta regulación es parte de un paquete integral que incluye revisiones importantes para mejorar la legislación sanitaria sobre animales y vegetales.

Las nuevas reglas contribuirán significativamente a modernizar y fortalecer los controles efectuados por las autoridades públicas, y para luchar contra las prácticas fraudulentas y engañosas, que perjudican a los consumidores y las empresas que respetan la ley por igual.

El Gobierno de Melilla alerta tras dos casos de rabia en perros abandonados

Según una nota de prensa del área de Sanidad, uno de los casos se diagnosticó el día 7 de junio y corresponde a una perra adulta mestiza, de alzada mediana y de color negro que fue capturada en un solar cercano al polvorín.

El segundo animal fue recogido por una persona el día 12 de junio cuando vagaba por la zona de la pérgola-Pueblo y se trata de un macho joven, mestizo, alzada mediana y capa blanca.

Sanidad recomienda que si alguna persona ha sido mordida o ha tenido contacto salival con estos perros en las fechas indicadas o anteriores acuda a la Dirección General de Sanidad y Consumo de la Ciudad Autónoma o contacte con la Policía Local para iniciar el tratamiento en caso necesario.

Hasta 30 pesticidas en el polen de las abejas

Cuando regresan a sus colmenas, las abejas pueden llevar en su cuerpo hasta una treintena de pesticidas. Aunque los neonicotinoides usados en la agricultura moderna forman parte del cóctel, un estudio muestra ahora que al menos la mitad de los insecticidas encontrados en una abeja no proceden del campo: se trata de piretroides usados en entornos urbanos y domésticos contra los mosquitos o para controlar los parásitos de perros y gatos.

Salud abre diligencias para esclarecer responsabilidades sobre el brote de botulismo

La Conselleria de Salud de la Generalitat catalana ha abierto diligencias para esclarecer responsabilidades sobre el brote de botulismo detectado la pasada semana en la provincia de Girona, donde dos bomberos se encuentran ingresados en estado grave tras consumir judías blancas contaminadas en botes de conserva de cristal. Lo ha explicado el secretario de Salud Pública, Joan Guix, en rueda de prensa, después de que este lunes se haya confirmado la presencia de la toxina botulínica en un bote del lote L-146-16, envasado en La Rioja por Hermanos Cuevas S.A.

PUBLICACIONES

Molecular epidemiology of *Rhodococcus equi* in slaughtered swine, cattle and horses in Poland

Witkowski et al. BMC Microbiology (2016) 16:98
DOI 10.1186/s12866-016-0712-9

Rhodococcus equi es un patógeno zoonótico emergente presumiblemente transmitido por los alimentos. Dado que los datos sobre la prevalencia mundial de *R. equi* en animales de carne son escasos, el presente estudio tuvo como objetivo investigar la epidemiología molecular de *R. equi* en canales de cerdos, ganado vacuno y caballos destinados al consumo humano en Polonia.

En total, se examinaron 1028 muestras de ganglios linfáticos. *R. equi* se aisló en el 26,6% (105/395) de muestras porcinas y en el 1,3% (3/234) de las muestras de ganglios linfáticos submaxilares sanos procedentes de animales de la especie bovina. En los caballos, *R. equi* se aisló sólo en el 0,5% (1/198) de las muestras de ganglios linfáticos traqueo-branquiales medios, mientras que ninguna de las muestras del linfocentro retrofaríngeo fue positiva (0/198). Únicamente se observaron lesiones purulentas en el 0,8% de las muestras de ganglios linfáticos submaxilares porcinas (3/398), y en dos de ellas se detectó *R. equi*.

Todos los aislados de bovinos y la mayoría de los aislados de cerdos (98,1%) fueron vapB-positivo. El 87,9% de los aislados de cerdos portaban un plásmido de 95 kb de tipo 5, un 3,7% un plásmido de tipo 1 y un único aislado (0,9%) portaba los siguientes tipos de plásmidos: 4, 7, 10, 11, 21, 31. Todos los aislamientos bovinos portaban VAPB tipo 26. El único aislamiento en equino fue vapA-positivo y portaba un plásmido VAPA 85 kb tipo I.

La prevalencia de *R. equi* vapB-positivos en cerdos sanos investigados destinados a la alimentación humana fue muy alta.

No sólo los cerdos, sino también incluso el ganado bovino aparentemente sano o las canales de caballo deben ser considerados como una potencial fuente de *R. equi* para los seres humanos, especialmente en países existe tradición en el consumo de carne cruda o poco cocinada.

Agricultural crop exposure and risk of childhood cancer: new findings from a case-control study in Spain

Gómez-Barroso et al. Int J Health Geogr (2016) 15:18 DOI 10.1186/s12942-016-0047-7

El cáncer infantil es la principal causa de muerte debida a una enfermedad en niños en España. Aunque es poco lo que se sabe acerca de la etiología, los factores ambientales son posibles explicaciones para una fracción de los casos. Estudios previos han demostrado que los pesticidas se asocian con el cáncer infantil. La dificultad de reunir datos personales de exposición ambiental es una limitación importante; esta falta de

información sobre los pesticidas motivó el desarrollo de nuevos métodos para estimar esta exposición. Hemos desarrollado un índice de exposición a cultivos basados en información geográfica para estudiar la relación entre la exposición a diferentes tipos de cultivos y riesgo de los tumores infantiles. Se realizó un estudio de caso y control de base poblacional sobre el cáncer infantil abarcando 3350 casos y 20.365 controles en dos regiones españolas. Utilizamos el CORINE Land Cover para obtener datos sobre el uso del suelo agrícola. Se tomó una zona de 1 km alrededor de cada niño y calculamos el porcentaje de la superficie de cultivo dentro de esta zona (Índice Global de cultivos) para el total de cultivos y de los distintos tipos de cultivos. Se encontró un exceso de riesgo entre los niños que viven en la proximidad de los cultivos. Para los cultivos totales nuestros resultados mostraron exceso de riesgo en casi todos los grupos de diagnóstico y un aumento del riesgo con el aumento del valor del índice de cosecha. Los análisis realizados por región y tipo individual de cultivo también mostraron un exceso de riesgo.

Los resultados sugieren que vivir en la proximidad de la tierra cultivada podría ser un factor de riesgo para varios tipos de cáncer en los niños.

First detection of *Onchocerca lupi* infection in dogs in southern Spain

Miró et al. Parasites & Vectors (2016) 9:290
DOI 10.1186/s13071-016-1587-1

Onchocerca Lupi es la causa de una patología ocular de diversa gravedad en perros desde el suroeste de los Estados Unidos, Europa Occidental hasta el norte de Asia. Esta filaria también ha sido reconocida como un agente zoonótico en Túnez, Turquía, Irán y en los EE.UU, aunque la información sobre la biología y la epidemiología de esta infección es en gran parte desconocida. En Europa, *O. Lupi* ha sido reportado en perros de Alemania, Grecia, Hungría, Portugal y Rumanía y en un gato de Portugal. El presente estudio fue diseñado para establecer la ocurrencia de *O. Lupi* en perros en el suroeste de España.

En el presente estudio fueron examinados un total de 104 perros de diferente raza, sexo y edad que viven en un refugio en Huelva (SO España). Se recogieron muestras consistentes en raspados de piel utilizando un bisturí desechable en las regiones de la frente e inter-escapular y se almacenaron en solución salina (0,5 ml) antes de la observación individual del sedimento mediante microscopía de luz y del examen molecular. De los 104 perros examinados, 5 (4,8%) eran positivos para *O. Lupi*: dos por microscopía y tres por PCR. Uno de los perros infectados con *O. Lupi* presentó signos neurológicos, aunque no se detectaron anomalías mediante ecografía ocular y/o MRI. En este primer informe sobre la infestación en perros por *O. Lupi* en el sur de

España se amplía la distribución geográfica de este parásito y se dispara una señal de alarma para los profesionales y los médicos que trabajan en este área.

Assessment of foot health and animal welfare: clinical findings in 229 dairy Mediterranean Buffaloes (*Bubalus bubalis*) affected by foot disorders

Guccione et al. BMC Veterinary Research (2016) 12:107 DOI 10.1186/s12917-016-0726-4

La cojera representa la tercera causa más importante relacionada con la salud que genera mayores pérdidas económicas en la industria láctea, después de la fertilidad y la mastitis. Aunque los búfalos mediterráneos (MB-mediterranean buffaloes) de aptitud láctea y las vacas lecheras comparten sistemas similares de cría que predisponen a problemas similares en el rebaño, los estudios publicados que exploran su relevancia y su papel en estos rumiantes son todavía escasos e incompletos. Los objetivos de este estudio fueron describir los hallazgos clínicos relacionados con los trastornos de las pezuñas (FD- foot disorders) en MB de aptitud láctea y su influencia en el bienestar de los animales, determinado por la evaluación del índice de locomoción (LS-locomotion score), el índice de condición corporal (BCS-body condition score) y el índice de limpieza (CS). De 1297 MB multiparas sometidas a procedimientos de recorte de pezuñas de rutina, 229 búfalos mostraron al menos un FD. La prevalencia de búfalos afectados por FD fue del 17,7%, mientras que los índices de motilidad y cojera fueron del 84,1% (1091/1297) y 15,9% (206/1297), respectivamente. El sobrecrecimiento de las pezuñas estaba presente en el 17,0% (220/1297), la pezuña sacacorchos en 15,8% (205/1297), flemón interdigital en el 0,9% (12/1297), absceso de la línea blanca en un 0,8% (11/1297), dermatitis digital, en 0,1% (1/1297) y la hiperplasia interdigital en 0,1% (1/1297). La presencia simultánea de FD se registró en el 17,0% de MB (221/1297): sobrecrecimiento de la pezuña y pezuña sacacorchos se presentaban juntas en el 15,8% de los casos (205/1297), el sobrecrecimiento y flemón interdigital en el 0,3% (4/1297), el sobrecrecimiento y el absceso de la línea blanca en el 0,8% (11/1297), la dermatitis digital y la hiperplasia interdigital en 0,1% (1/1297). La presencia de FD siempre se asoció con cojera (LS> 2), con excepción de 23 MB que presentaban sobrecrecimiento y flemón interdigital simultáneamente. La mayoría de MB situados en el grupo de baja condición corporal (95,5%, 43/45) y todos aquellos con CS> 2 (122/122) tenían un índice de locomoción por encima del umbral de normalidad (LS> 2). Por otra parte, las enfermedades de la pezuña como los abscesos de la línea blanca, la dermatitis digital o la hiperplasia interdigital parecían ocurrir más frecuentemente asociadas con una disminución de la

BCS y un aumento de las puntuaciones de CS. Este estudio describe por primera vez la participación de la enfermedad de la línea blanca, el flemón interdigital, la dermatitis digital y la hiperplasia interdigital en los trastornos de las pezuñas de búfalos mediterráneos de aptitud láctea y muestra su asociación con un deterioro del bienestar animal.

Persistent organochlorine pesticide residues in cocoa beans from Ghana, a concern for public health

Okoffo et al. International Journal of Food Contamination (2016) 3:5 DOI 10.1186/s40550-016-0028-4

A prospective multicenter evaluation of direct molecular detection of blood stream infection from a clinical perspective

Nieman et al. BMC Infectious Diseases (2016) 16:314 DOI 10.1186/s12879-016-1646-4

Factors influencing the time between onset of illness and specimen collection in the diagnosis of non-pregnancy associated listeriosis in England and Wales

Awofisayo-Okuyelu et al. BMC Infectious Diseases (2016) 16:311 DOI 10.1186/s12879-016-1638-4

Protocol of the Belgian food consumption survey 2014: objectives, design and methods

Bel et al. Archives of Public Health (2016) 74:20 DOI 10.1186/s13690-016-0131-2

Campylobacter jejuni-associated perimyocarditis: two case reports and review of the literature

Hessulf et al. BMC Infectious Diseases (2016) 16:289 DOI 10.1186/s12879-016-1635-7

Changing distribution of age, clinical severity, and genotypes of rotavirus gastroenteritis in hospitalized children after the introduction of vaccination: a single center study in Seoul between 2011 and 2014

Shim et al. BMC Infectious Diseases (2016) 16:287 DOI 10.1186/s12879-016-1623-y

NOVEDADES LEGISLATIVAS

Sentencia de 16 de marzo de 2016, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que anula los siguientes extremos del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, que regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras

Resolución de 24 de mayo de 2016, de la Secretaría General de Política Territorial y Administración Local, por la que se acuerda la apertura del trámite de audiencia e información pública sobre el proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 187/2010, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Festejos Taurinos Populares de Extremadura.

Orden PRE/847/2016, de 31 de mayo, por la que se establecen los animales y productos incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 993/2014, de 28 de noviembre, por el que se establece el procedimiento y los requisitos de la certificación veterinaria oficial para la exportación.

Reglamento de ejecución (UE) 2016/854 de la Comisión de 30 de mayo de 2016 por el que se autorizan determinadas declaraciones de propiedades saludables en los alimentos, distintas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños y se modifica el Reglamento (UE) n.º 432/2012

CURSOS Y FORMACIÓN**IX Jornadas Técnicas IGP 'Cordero de Extremadura' CORDEREX**

Tendrán lugar el próximo miércoles, 13 de julio, a partir de las 11:00 horas, en el Centro Cultural de Castuera.

Vino, aceite y jamón ibérico en la cultura mediterránea: propiedades nutricionales y cata

Plasencia del 21 al 23 de septiembre de 2016
Este es un curso teórico práctico en el que abordaremos el estudio de elementos de nuestra cultura mediterránea, de interés y tradición. Se explicará de manera muy detallada, por una parte, unos conocimientos teóricos sobre sus características nutricionales y sensoriales así como las reglas para su cata. Se realizarán prácticas de cata dirigidas de los diversos tipos de vinos comentados en cada sesión. También se abordará los aspectos nutricionales del jamón y su maridaje con el vino.

Máster en Alimentación, Ética y Derecho

Plazo de preinscripción hasta el 2 de octubre de 2016, inicio del curso el 7 de octubre de 2016. Universidad de Barcelona.

El Máster en Alimentación, Ética y Derecho (MAED) plantea una formación específica en Derecho y Ética para profesionales que realizan su actividad en el ámbito de la investigación y la producción agroalimentaria. Este programa ofrece, por tanto, conocimientos y herramientas multidisciplinares que facultan al alumno para el desarrollo de nuevas habilidades que permitan el ejercicio efectivo de sus responsabilidades.

II Curso de Aplicaciones de la Citometría de Flujo al Estudio de las Enfermedades Infecciosas

Badajoz del 26 al 29 de septiembre de 2016

Objetivos: Presentar las últimas Novedades en la detección de microorganismos. Conocer las aplicaciones de la citometría de flujo en Microbiología Clínica. Desarrollar protocolos de detección y análisis. Conocer el manejo del equipamiento. Tinciones y análisis de muestras. Conocer técnicas afines que pueden aumentar la calidad de la información obtenida.

Modelo alimentario y tipificación ponderal de la población española: modelo teórico y datos actualizados

San Lorenzo del Escorial, Madrid.

Del 18 al 20 de julio de 2016

El importante aumento global de la obesidad es uno de los retos más difíciles en salud pública que debe afrontar la sociedad actual. Valores elevados del IMC y la obesidad abdominal (OA) presentan asociaciones bien conocidas con la mortalidad por todas las causas, morbilidad y discapacidad y como consecuencia, años de vida con deterioro del estado de salud y baja calidad de vida, que repercuten en un aumento en el gasto sanitario.

OPOSICIONES

[Resolución de la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas de 25 de mayo de 2016](#), a petición del director general de Función Pública y Administraciones Públicas, por la que se convoca un concurso para constituir una bolsa extraordinaria para cubrir, con carácter de interinidad, plazas vacantes del cuerpo facultativo superior, escala sanitaria, especialidad veterinaria, para la isla de Menorca, de la Administración especial de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears

[Acuerdo de 14/06/2016](#), del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2016 (15 plazas para veterinarios).

ANUNCIOS

Acuerdo SIVEX y el centro formación AL-QÁZERES para que los afiliados tenga una TARIFA ESPECIAL: 20 % DESCUENTO EN PAGOS MENSUALES.

"PREPARACIÓN ESPECÍFICA DE OPOSICIONES PARA VETERINARIOS "AL-QÁZERES" en Cáceres. GRUPOS DE PREPARACIÓN EN MARCHA DESDE FEBRERO DE 2016 PARA JUNTA DE EXTREMADURA (Titulados Superiores y Escala Facultativa Sanitaria) y SES.

Los interesados pueden ponerse en contacto en los teléfonos/e-mails que aparecen, donde les podrán informar gustosamente y sin compromiso "DE SUS EXCELENTES RESULTADOS Y METODOLOGÍA":

TFNOS: 605155616 y 615897124.

Mail: alqazeres@oposicionesparaveterinarios.com
santopos@gmail.com

Para cualquier sugerencia, colaboración, duda o corrección póngase en contacto con nosotros a través del correo electrónico:

boletinveterinario@sivex.org



Si es usted miembro de SIVEX y desea recibir el boletín, envíe un mensaje a la cuenta boletinveterinario@sivex.org especificando en el asunto "**ALTA BOLETÍN**".

Si desea dejar de recibir el resumen de en su correo, envíe un mensaje a la cuenta boletinveterinario@sivex.org especificando en el asunto "**BAJA BOLETÍN**".

Sus datos personales aportados en la solicitud serán tratados por SIVEX, con sede en Avda. Virgen de Guadalupe, 20 Despachos Profesionales 10001 Cáceres, con la finalidad de gestionar su suscripción y enviarle periódicamente por medios electrónicos la información solicitada. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la Secretaría General de SIVEX en la dirección anteriormente indicada mediante solicitud escrita acompañada de copia del DNI. De todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.