

NOTICIAS

[Canarias entra en la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria](#)

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha admitido como miembro al **Servicio Canario de la Salud (SCS)**, que se convierte así en el primer servicio sanitario español en formar parte de este organismo, según informó el Gobierno regional.

La Consejería de Sanidad destacó, a través de un comunicado, que este hecho permite al SCS "subir al más alto nivel de calidad europea en materia de seguridad alimentaria".

Además, añade, le abre "la posibilidad de participar en el trabajo preparatorio de dictámenes científicos, asistencia científica y técnica, recopilación de datos e identificación de riesgos emergentes, consiguiendo financiación europea para realizar estos trabajos conjuntamente con las universidades de las islas".

[La Guía Alimentaria elaborada por el USDA pone de manifiesto la relevancia de la carne y los productos cárnicos en una dieta sana \(eurocarne\)](#)

En el subgrupo de las carnes rojas, carne de aves y ovoproductos, en el grupo de 2.000 calorías recomienda unas 26 onzas (737 gramos) de estos productos a la semana, en la misma línea de las recomendaciones del año 2010.

Las Guías Alimentarias establecen que las carnes procesadas y las de aves pueden formar parte dentro de hábitos de consumo saludables a condición de que estén dentro de los límites diarios de ingesta de sodio, calorías provenientes de grasas saturadas, azúcares añadidos y calorías totales

[Informe conjunto de EFSA y ECDC sobre tendencias y fuentes de zoonosis, agentes zoonóticos y brotes de enfermedades transmitidas por alimentos](#)

Este informe conjunto de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, siglas en inglés) y del Centro Europeo para la prevención y control de Enfermedades (ECDC), presenta los resultados de las actividades de monitorización de zoonosis llevadas a cabo en 2014 en 32 países europeos (28 Estados Miembros y 4 No Miembros).

Los casos de listeriosis y campilobacteriosis aumentaron durante el año 2014 entre la población europea. También aumentaron ligeramente ese año los casos humanos de salmonelosis, por primera vez desde el año 2008.

En 2014, se registraron un total de 5.251 brotes de origen alimentario, en comparación con 5.196 brotes comunicados en 2013.

La mayoría de los brotes de origen alimentario fueron causados por virus, seguido de

Salmonella, las toxinas bacterianas y Campylobacter y con agente causal desconocido en el 29,1% de todos los brotes. Principalmente, los alimentos involucrados en los brotes fueron los huevos y ovoproductos, seguidos de crustáceos, mariscos, moluscos y productos derivados.

[Lanzamiento de la convocatoria transnacional de la ERANET SusAn](#)

La ERANET SusAn ha lanzado su convocatoria el pasado 4 de enero abierta hasta el 29 de marzo de 2016 para la presentación de propuestas de proyectos.

Esta convocatoria está dirigida a propuestas de proyectos con enfoque interdisciplinar y multi-actor definido en H2020 que cubran las siguientes tres áreas de investigación en sistemas sostenibles de producción animal:

Economía: Mejorar la productividad, capacidad de recuperación y la competitividad de la producción animal europea.

Medio ambiente: mejorar y gestionar el uso de recursos para reducir los residuos y mejorar la sostenibilidad ambiental de la producción animal europea.

Sociedad: Mejorar las prácticas en la explotación para mejorar la aceptabilidad del consumidor y abordar retos sociales asociados con el bienestar animal, la calidad y seguridad alimentaria de los productos, la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos

[Seguridad de la leche con tratamiento UV como nuevo alimento conforme al Reglamento \(CE\) n.º 258/97](#)

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha emitido un informe favorable a la leche tratada con luz ultravioleta (UV), con la finalidad de aumentar las concentraciones de vitamina D3 y extender la vida útil de la leche. El nuevo alimento es la leche de vaca (entera, semidesnatada o desnatada) al cual se aplica un tratamiento con radiación ultravioleta (UV) tras su pasteurización con el fin de extender la vida útil de la leche. Dicho tratamiento proporciona un aumento de las concentraciones de vitamina D3.

[Actualización sobre los focos Influenza Aviar en Francia a 18 de enero de 2016](#)

Hasta la fecha se han confirmado 69 brotes de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) en el suroeste de Francia.

En el Dictamen emitido por la Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria (ANSES) se confirma la ausencia de marcadores clave de peligro para humanos. Por otro lado, las investigaciones de

laboratorio muestran que este virus no está relacionado con la cepa del virus de IAAP H5N1 "asiático", la cepa del virus detectado en Francia es de origen europeo. Los subtipos detectados: H5N1 de origen europeo, H5N1, H5N2 y H5N9.

PUBLICACIONES

[African swine fever virus transmission cycles in Central Europe: Evaluation of wild boar-soft tick contacts through detection of antibodies against Ornithodoros erraticus saliva antigen](#)

Pietschmann et al. BMC Veterinary Research (2016) 12:1 DOI 10.1186/s12917-015-0629-9
Resumen: La Peste Porcina Africana (PPA) es una de las enfermedades virales más complejas que afectan a cerdos domésticos y salvajes. Es causada por el virus PPA, único virus ADN que puede ser eficazmente transmitido por un vector artrópodo, las garrapatas blandas del género Ornithodoros. Estas garrapatas pueden formar parte de los ciclos de transmisión del virus PPA y, en Europa, O. erraticus ha demostrado ser el responsable del mantenimiento a largo plazo del virus PPA en España y Portugal. En 2014, la enfermedad ha sido reintroducida en la Unión Europea, afectando a cerdos domésticos y también, muy destacablemente, a la población de jabalíes euroasiáticos. En un primer intento de evaluar el riesgo de transmisión entre garrapatas y jabalíes en Europa Central, que podría complicar gravemente la erradicación de la enfermedad, cerca de 700 sueros preexistentes obtenidos de jabalíes cazados en cuatro estados federales alemanes fueron investigados para detectar la presencia de anticuerpos dirigidos contra antígenos salivares de garrapatas O. erraticus usando un ELISA indirecto.

Resultados: De todas las muestras, 16 reaccionaron con una densidad óptica entre moderada y elevada, que podría considerarse indicativa de una picadura de garrapata en los jabalíes muestreados. Sin embargo, en estas muestras no se aprecia una agupación geográfica (fueron recogidas en regiones geográficas distantes entre sí) y fueron de mala calidad (hemólisis/impurezas). Además, todas las muestras procedían de áreas con climas subóptimos para las garrapatas blandas. Por este motivo, las falsas reacciones positivas son probables.

Conclusión: El estudio no aporta evidencias rigurosas de contacto entre garrapatas blandas y jabalíes en los estados federales alemanes investigados y, además, es improbable un papel relevante de los jabalíes alemanes en la epidemiología de la PPA. Este hecho facilita la erradicación de la PPA en el área, aunque otra relaciones complejas (biología de los jabalíes y

las interacciones con los cerdos domésticos) necesitan ser consideradas.

[Cat scratches, not bites, are associated with unipolar depression - cross-sectional study](#)

Flegr and Hodný. Parasites & Vectors (2016) 9:8 DOI 10.1186/s13071-015-1290-7

Resumen: Un estudio reciente llevado a cabo sobre 1,3 millones de pacientes mostró una fuerte asociación entre ser mordido por un gato y la probabilidad de ser diagnosticado con depresión. Los autores sugirieron que la

infección con el parásito felino Toxoplasma podría ser el motivo de esta asociación.

Estudio: Se llevó a cabo un estudio transversal (de prevalencia o cross-sectional study) a través de internet, sobre una población no clínica de 5535 sujetos.

Resultados: Los sujetos que afirmaron haber sido mordidos por un perro o un gato o arañados por un gato mostraron una mayor calificación en el Índice Beck para la depresión. Estos sujetos mostraron mayor probabilidad de haber visitado al psiquiatra, al psicólogo o al neurólogo en los últimos 2 años, haber sido diagnosticados con depresión (pero no con desorden bipolar). Un análisis multivariable de modelos con mordedura de gato, arañazo de gato, toxoplasmosis, número de gatos en casa, y la edad de los sujetos como variables independientes mostró que sólo el arañazo de gato tuvo un posible efecto en la depresión ($p=0.004$). La mordedura de gato y la toxoplasmosis no tuvieron efectos sobre la depresión y el número de gatos en casa tuvo un efecto negativo sobre la depresión ($p=0.021$).

Conclusión: La ausencia de asociación entre la toxoplasmosis y la depresión y una asociación cinco veces más fuerte entre la depresión y el arañazo de un gato que entre la depresión y la mordedura de un gato sugieren que el patógeno responsable de estos trastornos del estado de ánimo es probable que no sea el protozoo Toxoplasma sino otros organismos; posiblemente el agente causante de la enfermedad del arañazo del gato- la bacteria Bartonella henselae.

[Transmission of sheep and bovine spongiform encephalopathy to pigs](#)

Hedman et al. Vet Res (2016) 47:14 DOI 10.1186/s13567-015-0295-8

La transmisión experimental del agente causante de la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) ha sido confirmada satisfactoriamente en cerdos inoculados a través de tres rutas diferentes (intracerebral, intraperitoneal e intravenosa).

Los resultados obtenidos demuestran la transmisión eficiente de la EEB de origen ovino en cerdos y muestran por primera vez que en esta especie es posible la diseminación de la

PrP^{SC} bovina en un amplio rango de tejidos periféricos. Estos resultados suponen un hito importante en la distribución y detección de priones en animales no rumiantes.

[First overall report of *Leptospira* infections in wild boars in Poland](#)

Żmudzki et al. Acta Vet Scand (2016) 58:3 DOI 10.1186/s13028-016-0186-7

Recientemente se ha observado un incremento de la población de jabalíes (*Sus scrofa*) en Europa. Esto es importante desde una perspectiva zoonótica ya que influye

directamente en la diseminación de muchas enfermedades. Por primer vez, se ha llevado a cabo una investigación extensa sobre la prevalencia de infección de *Leptospira* en jabalíes. Durante la temporada de caza 2012-2014, se han recogido 3621 muestras de sangre de jabalíes. Los animales procedían de diversas localizaciones geográficas de Polonia. Las muestras fueron analizadas utilizando un test de aglutinación microscópica (MAT) para detectar la presencia de anticuerpos específicos frente a los siguientes serovares: icterohaemorrhagiae, gryppotyphosa, sejroe, tarassovi, pomona, canicola, bratislava, autumnalis, hardjo y ballum. Se encontraron anticuerpos frente a todos los serovares excepto para el serovar ballum en 377 muestras de suero (10,4%). El número más alto de jabalíes seropositivos fue encontrado en la parte sureste de Polonia y en áreas altamente urbanizadas como Lilesia y Lodz.

La prevalencia relativamente alta de *Leptospira* en jabalíes puede constituir una amenaza para cazadores y para personas que entran en contacto con lagos de bosques y pantanos. Los resultados también indican que un incremento de los jabalíes que viven cerca de los límites de las ciudades podrían crear riesgos adicionales para los habitantes de las grandes áreas urbanas.

[Seroprevalence and “Knowledge, Attitudes and Practices” \(KAPs\) survey of endemic ovine brucellosis in Egypt](#)

Hegazy et al. Acta Vet Scand (2016) 58:1 DOI 10.1186/s13028-015-0183-2

[Microsphere-based antibody assays for human parvovirus B19V, CMV and *T. gondii*](#)

Wang et al. BMC Infectious Diseases (2016) 16:8 DOI 10.1186/s12879-015-1194-3

[Apramycin treatment affects selection and spread of a multidrug-resistant *Escherichia coli* strain able to colonize the human gut in the intestinal microbiota of pigs](#)

Herrero-Fresno et al. Vet Res (2016) 47:12 DOI 10.1186/s13567-015-0291-z

[Quantification of the increase in the frequency of early calving associated with late exposure to bluetongue virus serotype 8 in dairy cows: implications for syndromic surveillance](#)

Nusinovici et al. Vet Res (2016) 47:18 DOI 10.1186/s13567-015-0296-7

[A Public Health initiative on hepatitis E virus epidemiology, safety and control in Portugal – study protocol](#)

Mesquita et al. BMC Infectious Diseases (2016) 16:17 DOI 10.1186/s12879-016-1341-5

NOVEDADES LEGISLATIVAS

Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre del 2015, relativo a los **nuevos alimentos**.

Reglamento (UE) 2015/2285 de la Comisión de 8 de diciembre de 2015, por el que se modifica el anexo II del **Reglamento (CE) n° 854/2004**

Real Decreto 1025/2015 de 13 de noviembre por el que se modifica el Real Decreto 846/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las condiciones que deben cumplir las materias primas a base de materiales poliméricos reciclados para su utilización **en materiales y objetos destinados a entrar en contacto con los alimentos**.

Reglamento (UE) 2016/27 de la Comisión de 13 de enero de 2016 que modifica los anexos III y IV del Reglamento (CE) no 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen disposiciones para la prevención, el **control y la erradicación** de determinadas **encefalopatías espongiformes transmisibles**

CURSOS Y FORMACIÓN

One Health International Summer Course.
09.05.2016 - 23.08.2016.

9 DE MAYO - 10 DE JUNIO 2016: Curso de 5 semanas a través de internet en la plataforma coursera.org

16 - 23 DE AGOSTO 2016 (ambos días incluidos): Una semana de curso presencial en el Campus Frederiksberg de UCPH-Copenhague.

El curso de verano está enfocado en las zoonosis, enfermedades emergentes y problemas emergentes relacionados con la salud (resistencias a los medicamentos, toxinas, contaminantes,...).

[Programa e Inscripción](#)



13º Congreso AEOC de Seguridad

Alimentaria. Madrid. 18 de febrero de 2016.

El Congreso reunirá a los máximos responsables de las áreas de Calidad, Seguridad Alimentaria y Nutrición.

[Programa e Inscripción](#)

Alimentos, Calidad y Seguridad Alimentaria.

Plasencia. 4 y 5 de marzo de 2016.

[Programa e Inscripción](#)

[KAUSAL 2016](#) VI Congreso Internacional de

Autocontrol y Seguridad Alimentaria

Vitoria-Gasteiz 25, 26 y 27 de mayo de 2016.

Inscripción hasta el 30 de abril 350 €

OPOSICIONES

Oferta de empleo público: 5 plazas de Cuerpo Superior Facultativo Veterinario Junta de Andalucía. [BOJA nº 239 11/12/2015](#). Las ofertas de empleo público anuncian la futura convocatoria de las plazas.

Oferta de empleo público: 2 plazas de Veterinario Gobierno de las Islas Baleares. [BOIB nº 178 05/12/2015](#). Las ofertas de empleo público anuncian la futura convocatoria de las plazas.

Para cualquier sugerencia, colaboración, duda o corrección póngase en contacto con nosotros a través del correo electrónico:

boletinveterinario@sivex.org



Si es usted miembro de SIVEX y desea recibir el boletín, envíe un mensaje a la cuenta boletinveterinario@sivex.org especificando en el asunto **"ALTA BOLETÍN"**.

Si desea dejar de recibir el resumen de en su correo , envíe un mensaje a la cuenta boletinveterinario@sivex.org especificando en el asunto **"BAJA BOLETÍN"**

Sus datos personales aportados en la solicitud serán tratados por SIVEX, con sede en Avda. Virgen de Guadalupe, 20 Despachos Profesionales 10001 Cáceres, con la finalidad de gestionar su suscripción y enviarle periódicamente por medios electrónicos la información solicitada. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la Secretaría General de SIVEX en la dirección anteriormente indicada mediante solicitud escrita acompañada de copia del DNI. De todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.